

Super OXI – přípravek pro komplexní dezinfekci bazénové vody

Vzhled a složení: Čirá bezbarvá kapalina, obsahuje peroxid vodíku (100 g/l), ES 231-765-0, a stříbro (max. 0,4 g/l), ES 231-131-1.

Působení: Kyslíkový prostředek pro ošetření bazénů na bázi peroxidu vodíku a stříbra. Ve vodě se rozkládá za vzniku vody a aktivního kyslíku. Voda ani kyslík nezatěžují životní prostředí. Po jeho aplikaci voda nepáchne, nedráždí oči, sliznice a kůži, což jsou značné výhody oproti ošetřování vody chlorovými přípravky.

Návod k použití a dávkování: Doporučená dávka 100 ml/m³ vody každých 5–8 dní. Touto dávkou se do vody vpraví cca 4,5 mg/l aktivního kyslíku. Jestliže má být ošetření bazénové vody účinné, musí být koncentrace aktivního kyslíku udržována v rozmezí 5–15 mg/l. Pro zjištění koncentrace aktivního kyslíku ve vodě se používají speciální testovací soupravy. Dávku pomalu vlijte do skimmeru z výšky max. 5 cm tak, aby nedošlo k rozstříkávání kapek přípravku.

NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do odeznění příznaků. **Při styku s kůží:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Pokud dojde k podráždění, přivolejte lékařskou pomoc. **Při zasažení očí:** Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Vždy zajistěte lékařské ošetření.

Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. V případě problémů okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte uzavřeně nahoru v původním odvězdušeném obalu na chladném větraném místě chráněném před světlem a mrazem, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah kyselin, redukčních činidel, zápalných a hořlavých látek.

Upozornění: Uzávěr povolujte opatrně, uvnitř nádoby může být přetlak. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Samostatně používaný přípravek má ověřené algicidní účinky při dávkování 500 ml/1 m³ vody každých 5–8 dní.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Obsah: 3 l

Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylijejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné ho odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.



11313109

2369.011217.03

Distributor:
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz



MARIMEX
www.marimex.cz
www.marimex.sk

Super OXI – prípravok pre komplexnú dezinfekciu bazénovej vody

Vzhľad a zloženie: Číra bezfarebná kvapalina, obsahuje peroxid vodíka (100 g/l), ES 231-765-0, a striebro (max. 0,4 g/l), ES 231-131-1.

Pôsobenie: Kyslíkový prostriedok na báze peroxidu vodíka a striebra. Vo vode sa rozkladá na vodu a aktívny kyslík. Voda ani kyslík nezaťažujú životné prostredie. Po jeho aplikácii voda nepáchne, nedráždí oči, sliznicu a kožu, čo predstavuje značné výhody oproti ošetrovaniu vody chlórovými prípravkami.

Návod na použitie: Odporúčaná dávka je 100 ml/m³ vody každých 5–8 dní. Touto dávkou sa do vody dostane cca 4,5 mg/l aktívneho kyslíka. Pokiaľ má byť ošetrovanie bazénovej vody účinné, musí byť koncentrácia aktívneho kyslíka udržiavaná v rozmedzí 5–15 mg/l. Pre zaistenie koncentrácie aktívneho kyslíka vo vode sa používajú špeciálne testovacie súpravy. Dávku pomaly vlejte do skimmera z výšky max. 5 cm tak, aby nedošlo k rozstrekovaniu kvapiek prípravku.

NEBEZPEČENSTVO: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Predlekárská prvá pomoc: Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. **Pri styku s pokožkou:** Začnite oplachovať vodou a mydlom po dobu 15 minút. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. **Pri zasiahnutí očí:** Začnite ihneď vyplachovať prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Zaisťte lekárske ošetrenie. **Pri požití:** NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Dajte ihneď vypiť 1–2 poháre vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade problémov okamžite volejte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (2 5477 4166).

Skladovanie: Prípravok skladujte uzáverom hore v pôvodnom odvězdušenom obale na chladnom vetranom mieste chránenom pred svetlom a mrazom, oddelene od potravín, nápojov a krmív, mimo dosah kyselin, redukčných činidiel, zápalných a hořlavých látok.

Upozornenie: Uzávěr povolujte opatrně, vo vnútri nádoby môže byť pretlak. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka: Samostatne používaný prípravok má overené algicidné účinky pri dávkovaní 500 ml/1 m³ vody každých 5–8 dní.

Doba použitelnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržavaní skladovacích podmienok.

Obsah: 3 l

Likvidácia: Nepoužitý výrobek nevylijeajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobek alebo prázdný obal so zvyškami odovzdajte v zberní nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po dôkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčištění je možné ho odložit do nádob na zber komunálneho odpadu.

Datum výroby: Uvedený na obale.

Posúdené VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.

Číslo registrácie prípravku: bio/305/D/14/1/CCHLP

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk

